

HOJA INFORMATIVA – *La Peste*

LA PESTE CONSISTE DE DOS ENFERMEDADES PROVOCADAS POR UNA BACTERIA

- Las ratas, perros de las praderas y otros roedores son portadores de los gérmenes.
- Hay dos tipos de peste:
 - Bubónica
 - Neumónica

AMBOS TIPOS DE PESTE SE DESENVUELVEN DE DISTINTA FORMA

La peste bubónica

- No se contagia de persona a persona
- Se propaga por medio de picaduras de pulgas que han picado a animales que tenían la peste.
- La enfermedad se manifiesta 1–8 días después de haber sido picado por una pulga infectada. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, debilidad, bultos dolorosos debajo de la piel (o “bubos”).

La peste neumónica

- Puede contagiarse de persona a persona, generalmente por medio de fluidos nasales o bucales
- También puede producirse cuando la peste bubónica entra en los pulmones.
- La enfermedad se manifiesta en 1–4 días. Los síntomas incluyen neumonía, dolor de pecho, dificultad para respirar, tos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Consejo de Salud y Servicios Sociales de Kentucky Frankfort, KY

<http://chfs.ky.gov/dph/preparedness>

Centro Regional de Intoxicaciones del estado de Kentucky Louisville, KY

EMERGENCIAS: 1-800-222-1222

<http://www.krpc.com>

Lake Cumberland District Health Dept.
(606) 678 – 4761

Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) Atlanta, GA

Llamada Gratis: 1-800-311-3435

<http://www.bt.cdc.gov/agent/plague>

LA PESTE NEUMÓNICA ES MUY RARO

HOJA INFORMATIVA – *La Peste (continuación)*

LA PESTE PUEDE TRATARSE

- Para tratar ambos tipos de peste se usan antibióticos.
- Las personas que tienen peste neumónica pueden requerir una atención especial.
- No hay vacuna para prevenir la peste.
- Los seres humanos pueden reducir las probabilidades de contraer peste si
 - controlan a los roedores (ratas, ratones, etc.)
 - mantienen distancia con los animales salvajes
 - mantienen distancia con las personas que tienen la peste neumónica